


**ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ**  
(информация для пациента)



**Чистотела трава, измельченное сырье 50 г в пачке**  
**Chelidonii herba**

**Общая характеристика:**

кусочки листьев, стеблей, цветков и плодов различной формы, проходящие сквозь сито (5600). Цвет серовато-зеленый с желтыми вкраплениями. Запах своеобразный.

В траве чистотела содержатся алкалоиды: производные изохинолина (хелидонин, хелеритрин, сангвинарин и др.), протоберберинового алкалоиды (берберин, коптисин) и др.; эфирное масло, каротиноиды, флавоноиды (рутин, кемпферол, кверцетин), сапонины, аскорбиновая кислота, органические кислоты – яблочная, лимонная и янтарная.

**Форма выпуска.** Измельченное сырье.

**Фармакотерапевтическая группа.** Прочие средства, применяемые в дерматологии.

**Фармакологические свойства.** Настой чистотела травы оказывает местное противовоспалительное действие.

**Показания к применению.** Наружно: в составе комплексной терапии заболеваний кожи (дерматит, псориаз, экзема).

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

**Способ применения и дозы.** Около 20 г (6 столовых ложек) сырья помещают в эмалированную или другую подходящую посуду, заливают водой комнатной температуры 200 мл (1 стакан), закрывают крышкой, нагревают в кипящей воде (водяной бане) 15 мин. Охлаждают при комнатной температуре 45 мин, процеживают. Оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Наружно применяют для ванн (1 – 2 стакана настоя на ванну), в виде примочек (без разбавления).

Перед применением настоя рекомендуется взбалтывать.

Длительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства.

**Применение во время беременности и кормления грудью.** Не следует применять во время беременности и кормления грудью.

**Применение у детей.** Применение у детей до 18 лет не рекомендовано в связи с отсутствием достаточных данных.

**Влияние на способность управления автомобилем и работу с движущимися механизмами.** Исследования не проводились.

**Побочное действие.** Возможны аллергические реакции (в том числе гиперемия, зуд и высыпания на коже).

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

**Противопоказания.** Повышенная чувствительность к биологически активным веществам препарата, беременность, период лактации, детский возраст до 18 лет.

**Передозировка.** Информация о случаях передозировки при наружном применении отсутствует. При приеме внутрь возможно развитие тошноты, рвоты, болей в животе, диареи, желтухи, нарушений со стороны печени (повышение уровней в крови билирубина и печеночных ферментов, включая случаи развития токсического гепатита и печеночной недостаточности). При возникновении указанных симптомов необходимо обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

**Меры предосторожности.** Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Лечение проводят под контролем врача. Если во время лечения симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.


**Взаимодействие с другими лекарственными средствами.** Информация отсутствует. В случае одновременного применения других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

**Условия и сроки хранения.** Хранить в защищенном от влаги и света, недоступном для детей месте при температуре 15°C–25°C. Приготовленный настой при температуре от 8°C до 15°C – не более 2 суток.

**Срок годности.** 3 года.

**Условия отпуска.** Отпускают без рецепта.

**Упаковка.** По 50 г в пачке картонной с внутренним пакетом бумажным. В каждую пачку картонную вкладывают листок-вкладыш с информацией для пациента.



**Производитель. ООО «НПК Биотест».**

**Адрес. Республика Беларусь, 230014, г. Гродно, ул. Гожская, 2.**

**Тел. 8 (0152) 68-45-79.**

**Сайт: [www.biotest.by](http://www.biotest.by)**

