

Листок-вкладыш: информация для потребителя

Депантол®, (52,5 мг + 8,02 мг)/г, крем для наружного применения
 Действующие вещества: Декспантенол+Хлоргексидин

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нём содержатся важные для Вас сведения.

- Всегда применяйте препарат в точности с данным листком или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
- Сохраните этот листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его ещё раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается спустя 7 дней лечения или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание данного листка:

1. Что из себя представляет препарат Депантол® крем, и для чего его применяют
2. О чем следует знать перед применением препарата Депантол® крем
3. Применение препарата Депантол® крем
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата Депантол® крем
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

1. Что из себя представляет препарат Депантол® крем, и для чего его применяют
 Депантол® крем применяется для антисептической обработки небольших ран, таких как ссадины, царапины, небольшие порезы, трещины.

Если улучшение не наступило спустя 7 дней лечения или Вы чувствуете ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата Депантол® крем

Не применяйте препарат Депантол® крем:

- если у Вас аллергия (повышенная чувствительность) на хлоргексидин, декспантенол или любые другие компоненты препарата (перечислены в разделе б);
- если у Вас тяжелые, глубокие и сильно загрязненные раны, трофические язвы, а также с использованием окклюзионной повязки;

Не допускать попадания крема в глаза или в область около глаз, на слизистые оболочки и в ушной проход.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата Депантол® крем обратитесь за консультацией к врачу или работнику аптеки.

Депантол не следует применять для лечения кожных раздражений, не склонных к инфицированию (например, солнечные ожоги).

Частое нанесение крема на один и тот же участок кожи может привести к появлению раздражения.

Сообщалось о редких, но серьезных аллергических реакциях, включая анафилактический шок, при применении лекарственных средств, содержащих хлоргексидин. При появлении

симптомов серьезной аллергической реакции (например, свистящее или затрудненное дыхание, отек лица, крапивница, которая может быстро привести к более серьезным симптомам, сильная сыпь или шок), немедленно прекратите применение препарата и обратитесь за медицинской помощью.

Другие препараты и препарат Депантол® крем

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки, если Вы применяете или собираетесь применять любые другие лекарства.

Хлоргексидин не совместим с мылом и другими анионными веществами. В качестве меры предосторожности относительно возможного взаимодействия (взаимного или отрицательного воздействия), не следует применять Депантол® крем одновременно с другими антисептиками.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения данного препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Нет клинических данных о применении крема Депантол® у беременных. Следует избегать применения крема на обширных участках кожи.

Нет клинических данных о применении крема Депантол® во время грудного вскармливания и о выделении в грудное молоко. Кормящим женщинам не следует применять препарат в области груди или на больших участках.

Отсутствуют исследования влияния хлоргексидина и декспантенола на фертильность у человека. В исследованиях на животных не выявлено снижения фертильности после перорального применения хлоргексидина.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Не требуется никаких особых мер предосторожности.

Препарат Депантол® крем содержит цетостеариловый спирт и пропиленгликоль

Цетостеариловый спирт и пропиленгликоль могут вызывать местные кожные реакции (например, контактный дерматит).

3. Применение препарата Депантол® крем

Всегда применяйте данный препарат в полном соответствии с данным листком или рекомендациями лечащего врача, или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза, если врач не назначил иное:

Наносите крем тонким слоем на пораженный участок кожи два раза в день.

Продолжительность лечения

Продолжительность лечения зависит от характера заболевания и составляет в среднем 1-2 недели.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в листке-вкладыше.

Если Вы применили крема Депантол® больше, чем следовало



Частое, многократное применение препарата на одном и том же пораженном участке может привести к раздражению кожи..

При наличии вопросов по применению данного препарата, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам данный препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Перечисленные ниже нежелательные реакции указаны на основе добровольных сообщений, определить точную частоту встречаемости каждой из них не представляется возможным.

Серьезные нежелательные реакции и действия, которые необходимо предпринять

При возникновении следующих серьезных нежелательных реакций следует сразу прекратить применение препарата и немедленно обратиться за медицинской помощью:

- аллергические реакции, такие как контактный дерматит, аллергический дерматит, зуд, эритема, экзема, сыпь, крапивница, раздражение кожи и пузырьковая сыпь;
- гиперчувствительность, анафилактические реакции, анафилактический шок (потенциально опасный для жизни) с соответствующими лабораторными и клиническими проявлениями, включая симптомы астмы, от слабого до среднего поражения кожи, дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, включая сыпь, крапивницу, отеки, зуд, сердечную и дыхательную недостаточность. возможны аллергические реакции, такие как контактный дерматит, аллергический дерматит, зуд, эритема, экзема, сыпь, крапивница, раздражение кожи, анафилактическая реакция и анафилактический шок.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. К ним также относятся любые нежелательные реакции, не указанные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Республика Беларусь

РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» Министерства здравоохранения Республики Беларусь

Товарищеский пер., 2а, г. Минск, 220037

+375-17-299-55-14

www.rceth.by

5. Хранение препарата Депантол® крем

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на картонной пачке и контурной ячейковой упаковке после слов «Годен до».


Датой истечения срока годности является последний день месяца.

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Не выбрасывайте лекарственные препараты в канализацию. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Депантол® крем



Действующими веществами являются декспантенол и хлоргексидина биглюконат.

1 г крема содержит: декспантенол – 52,5 мг, хлоргексидина биглюконата раствор 20 % – 42,7 мг (в пересчете на хлоргексидина биглюконат - 8,02 мг).

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются: пропиленгликоль, макрогола цетостеарат, цетостеариловый спирт [цетиловый спирт не более 60 %, стеариловый спирт не менее 40 %], парафин жидкий, вазелин, натрия гидрофосфата додекагидрат, калия дигидрофосфат, вода очищенная.

Внешний вид препарата Деспантол® крем и содержимое упаковки

Крем для наружного применения.

Крем белого или почти белого цвета.

30 г в тубы алюминиевые. Каждую тубу вместе с инструкцией по применению лекарственного препарата в пачку из картона.

Условия отпуска из аптек

Отпускают без рецепта врача.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

АО «Нижфарм», Россия

ул. Салганская, д. 7, г. Нижний Новгород, 603950

Все претензии потребителей направлять представителю держателя регистрационного удостоверения или держателю регистрационного удостоверения:

АО «Нижфарм», Россия

ул. Салганская, д. 7, г. Нижний Новгород, 603950

Тел.: (831) 278-80-88; факс: (831) 430-72-28

E-mail: med@stada.ru

Листок-вкладыш пересмотрен

